

KADAR PENGGUNAAN BIO.SUBUR ORGANIC UNTUK KELAPA SAWIT

(Umur Produktif: 3-25 Tahun)

A. SW82 - Fokus: Sistem Akar & Ketahanan Penyakit

Fasa/Fenologi	Kadar & Kaedah Aplikasi	Kekerapan	Catatan Penting
Anak Benih (Pre-Nursery)	5 ml/L air (sembur daun)	Setiap 10 hari	Tingkatkan ketahanan terhadap fusarium
Pokok Muda (1-3 Tahun)	20ml/L air (siram bulatan pokok)	Setiap 6 minggu	Radius 1.5m dari pangkal pokok
Fasa Berbuah (Tahun 3+)	25ml/L air (siram zon akar)	Setiap 8 minggu	Gabung dengan baja Mg (10g Epsom salt/L)
Musim Kemarau	30ml/L air (sembur pelepah)	Setiap 4 minggu	Elakkan tekanan air & kebakaran

B. AA47 - Fokus: Hasil Minyak & Saiz Tandan

Fasa/Fenologi	Kadar & Kaedah Aplikasi	Kekerapan	Catatan Penting
Pra-Pendebungan	15ml/L air (sembur bunga)	2 minggu sebelum pendebungan	Tingkat nisbah bunga betina
Fasa Buah Muda	20ml/L air (sembur buah)	Setiap 6 minggu	Besarkan saiz buah & tingkatkan minyak
Fasa Buah Masak	10ml/L air (sistem fertigasi)	Setiap 10 hari	Untuk sistem tabur tali (drip)
Pasca Tuai	15ml/L air (sembur luka tuai)	Segera selepas tuai	Percepat penyembuhan batang

Gabungan Optimum: Siram SW82 (25ml/L) + AA47 (10ml/L) setiap 8 minggu untuk pokok matang → Tingkat hasil 20-30%