

KADAR PENGGUNAAN BIO.SUBUR ORGANIC UNTUK TANAMAN PISANG

(Kitaran: 9-12 Bulan)

A. SW82 - Fokus: Akar & Batang

Fasa/Fenologi	Kadar & Kaedah Aplikasi	Kekerapan	Catatan Penting
Anak Benih	Rendam sulur 10ml/L (30 minit)	1 kali	Kurangkan kejutan pindah
Fasa Vegetatif (0-5 Bulan)	15ml/L air (siram zon akar)	Setiap 4 minggu	Galakkan pertumbuhan pseudobatang
Fasa Berbunga	10ml/L air (sembur jantung)	Ketika bunga muncul	Elak reput jantung
Pasca Tuai	20ml/L air (siram sulur baru)	Segera selepas tuai	Stimulasi sulur pengganti

B. AA47 - Fokus: Saiz Tandan & Kemanisan

Fasa/Fenologi	Kadar & Kaedah Aplikasi	Kekerapan	Catatan Penting
Fasa Awal Berbuah	15ml/L air (sembur tandan muda)	Ketika sikat pertama muncul	Bungkus dengan plastik selepas sembur
Fasa Pengisian Buah	25ml/L air (sembur buah)	Setiap 3 minggu	Tingkatkan saiz jari & berat tandan
Pra-Tuai (2 Minggu)	10ml/L air (sistem fertigasi)	Setiap 5 hari	Tingkat Brix (kemanisan)

Gabungan Optimum: Sembur SW82 (10ml/L) + AA47 (15ml/L) pada fasa berbunga → Hasil tandan +35%